

شعبة المعلومات الدوائية / الصيدلة السريرية

تعرف على دوائك

ما هو الفلاجيل (Flagyl®)؟

الفلاجيل هو مضاد حيوي يثبط عمل البكتيريا اللاهوائية ويعمل ايضا كمضاد للطفيليات .

دواعي الاستعمال

يوصف الفلاجيل عادة لعلاج :

- * التهابات الأمعاء الناتجة عن الطفيليات (مثل الأميبا و الجيارديا)
- * التهابات المهبل البكتيرية والدمامل والخراج و التهابات اللثة و الاسنان
- * قرحة المعدة الناجمة عن بكتيريا H. pylori

الأشكال الدوائية



شراب معلق : ١٢٥ ملغم/٥مل

تحاميل مهبلية : ٥٠٠ ملغم

أقراص في الفم : ٢٥٠ ملغم - ٥٠٠ ملغم

الجرعات / و طريقة أخذ العلاج

الجرعات :

*الالتهابات المهبلية التي تسببها البكتيريا اللاهوائية :

- الأقراص: ٥٠٠ ملغم عن طريق الفم مرتين يوميا لمدة ٧ ايام.
- التحاميل المهبلية : تحميلة واحدة يوميا في المهبل من ٧- ١٠ ايام .

شعبة المعلومات الدوائية / الصيدلة السريرية

تعرف على دوائك

*الامراض المعوية الطفيلية (وتشمل داء الاميبيا) : ٧٥٠ ملغم ثلاث مرات يوميا عن طريق الفم لمدة ٥-١٠ ايام .

*قرحة المعدة (H.pylori) : ٥٠٠ ملغم مرتين باليوم لمدة ١٠ الى ١٤ يوم في حالة العلاج الثلاثي أو ٢٥٠ ملغم ٤ مرات يوميا لمدة ١٠-١٤ يوم في حالة العلاج الرباعي.

* التهابات اللثة والأسنان: ٢٥٠ ملغم كل ٨ ساعات لمدة ٣-٧ ايام.

🌈 طريقة أخذ العلاج :

الاقراص :

- يجب ابتلاع القرص كاملاً دون مضغ او طحن مع او بدون طعام ولكن يفضل مع الطعام .
- جرعة وفترة العلاج تختلف باختلاف سبب استعمال الدواء لذلك عليك الالتزام بذلك.

التحاميل المهبلية : يتم ادخال تحميلة واحدة الى ابعد جزء ممكن داخل المهبل مرة واحدة يوميا قبل النوم

ماذا أفعل في حال نسيان الجرعة

خذ الجرعة فور تذكرها الا إذا حان وقت الجرعة التي تليها فتخطاها ولا تأخذ جرعتين في نفس الوقت .

طريقة حفظ الدواء

- يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال .
- يحفظ في مكان جاف بعيداً عن الضوء والرطوبة وفي درجة حرارة لا تتعدى ٢٥ مئوية

ماذا يجب أن أعرف عن علاجي

- لا تأخذ هذا الدواء لعلاج حالات الاسهال الا بعد استشارة الطبيب .
- يجب عدم تناول الكحول خلال فترة العلاج ولغاية ٣ ايام بعد انتهاء العلاج.
- تجنب القيادة خلال فترة العلاج إلى حين معرفة تأثير الدواء عليك لأن هذا الدواء يمكن أن يسبب دوخة ونعاس .
- لا يستخدم هذا الدواء لعلاج الالتهابات الفيروسية .
- اخبر طبيبك اذا كنت تعاني من اضطرابات عصبية او نفسية، مرض في الكبد، مشاكل في الدم او

شعبة المعلومات الدوائية / الصيدلة السريرية

تعرف على دوائك

حساسية من الدواء.
- لا تأخذ هذا الدواء ان كنت تعاني من فرط حساسية ضد القمح.

الأعراض الجانبية ومتى يجب الاتصال بالطبيب :

✚ الأعراض الجانبية الأكثر شيوعا:

*الم في المعدة ، غثيان ، تقيؤ ، اسهال ، فقدان الشهية، طعم معدني
*صداع
*بول داكن اللون
*طفح جلدي

✚ يجب استدعاء مقدم الرعاية الصحية:

*حدوث تفاعل تحسسي شديد و مفاجيء منذ الجرعة الاولى (ضيق تنفس -دوار- غثيان) .
*ظهور احمرار مع بثور شاملا كافة الجسم و مصحوبا بحمى عند بداية العلاج.
*ظهور عدم تناسق بالحركات الارادية .

هل يستعمل من قبل المرأة الحامل و المرأة المرضع

****المرأة الحامل :**

ممنوع خلال اول ٣ اشهر من الحمل و بعدها يستخدم للحاجة الماسة باشراف الطبيب .

****المرأة المرضع :**

يجب وقف الرضاعة اثناء فترة العلاج .

التداخلات الغذائية و الدوائية مع علاجي

التداخلات الغذائية :

****عدم تناول الكحول اثناء فترة العلاج و لمدة ٣ ايام بعد انتهاء العلاج .**

التداخلات الدوائية:

مميع الدم الوارفارين :

**** في حالة وجوب اعطاء الوارفارين مع الفلاجيل :**

شعبة المعلومات الدوائية / الصيدلة السريرية

تعرف على دوائك

يفضل اعطاء جرعة مخففة من الوارفارين و مراقبة درجة التميع خوفا من النزيف .

الفحوصات الدورية التي علي القيام بها عند أخذ العلاج

- فحص دم شامل

*اعداد طلاب دكتور صيدلة :

ايمن الفارس

تالا الغزو

*إشراف الدكتورة الصيدلانية :

إشراق العبويني